

表6 脳卒中情動障害スケール(JSS-E)

(日本脳卒中学会Stroke Scale委員会)

1. 気分		
A. 気分爽快やうつ気分はなく、普通にみえる		<input type="checkbox"/> A = -0.93
B. 気分がふさいでいる様子がある		<input type="checkbox"/> B = -0.68
C. 気分が沈む、寂しい、悲しいという明らかな訴えや素ぶりがある		<input type="checkbox"/> C = 1.61
2. 日常生活動作・行動(入浴・着替え・洗面・娯楽など)に関する自発性と意欲の低下		
A. 自発的に活動し、通常の意欲がある		<input type="checkbox"/> A = -1.05
B. 日常生活動作に働きかけが必要で、意欲に欠ける		<input type="checkbox"/> B = -0.67
C. 働きかけても活動せず、まったく無気力である		<input type="checkbox"/> C = 1.72
3. 不安・焦燥		
A. 不安感やいらいら感はない		<input type="checkbox"/> A = -2.04
B. 不安感やいらいら感が認められる		<input type="checkbox"/> B = -0.44
C. いらいら感をコントロールできず、落ち着きない動作・行動がしばしばみられる		<input type="checkbox"/> C = 2.47
4. 脱抑制行動(易怒性、性的逸脱行動)		
A. 感情や異常な行動を抑制できる		<input type="checkbox"/> A = -5.53
B. 悪態や乱暴な言葉、または軽い性的な言動が見られる(エロチックな発言や体にさわるなど)		<input type="checkbox"/> B = -0.78
C. 異常で明らかな怒りや逸脱行為が見られる(物を投げる、つねる、たたく、ひっかく、蹴る、噛みつく、つばを吐く、叫ぶ、服をかけて脱ぐなどの行動)		<input type="checkbox"/> C = 6.31
5. 睡眠障害		
A. よく眠れる		<input type="checkbox"/> A = -1.72
B. よく眠れない(入眠障害、熟眠障害ないしは早朝覚醒)		<input type="checkbox"/> B = -0.98
C. 夜間の不穏(せん妄をふくむ)がある		<input type="checkbox"/> C = 2.70
※付加情報：Bを選択した場合、以下のうち認められるものに○をする。複数選択可。		
入眠障害() 途中覚醒・熟眠障害() 早朝覚醒()		
6. 表情		
A. 表情は豊かで、明るい		<input type="checkbox"/> A = -0.80
B. 表情が乏しく、暗い		<input type="checkbox"/> B = -0.45
C. 不適切な感情表現(情動失禁など)がある		<input type="checkbox"/> C = 1.25
7. 病態・治療に対する対応		
A. 自分の身体の状態を認識し、その治療に前向きである		<input type="checkbox"/> A = -1.18
B. 自分の身体の状態を認識しているが、治療への積極性がない		<input type="checkbox"/> B = -0.29
C. 自分の身体の状態を認識していない		<input type="checkbox"/> C = 1.47
8. 対人関係		
A. 家族やスタッフとの交流は良好である		<input type="checkbox"/> A = -1.30
B. 家族やスタッフとのかわりに消極的で、関心が薄い		<input type="checkbox"/> B = -0.58
C. 周囲との交流はほとんどなく、人との接触に拒否的である		<input type="checkbox"/> C = 1.89
TOTAL =		<input type="text"/>
CONSTANT		+14.00
TOTAL SCORE =		<input type="text"/>

(日本脳卒中学会・脳卒中感情障害(うつ・情動障害)スケール. 脳卒中 2003; 25: 205-214)