

日本脳卒中学会・脳卒中情動障害スケール

Japan Stroke Scale ( Emotional Disturbance Scale ) ( JSS-E )

[1] 気分

- A : 気分爽快やうつ気分はなく、普通にみえる
- B : 気分がふさいでいる様子がある
- C : 気分が沈む、寂しい、悲しいという明らかな訴えや素ぶりがある

A = -0.93  
B = -0.68  
C = 1.61

[2] 日常生活動作・行動(入浴・着替え・洗面・娯楽など)に関する  
自発性と意欲の低下

- A : 自発的に活動し、通常の意欲がある
- B : 日常生活動作に働きかけが必要で、意欲に欠ける
- C : 働きかけても活動せず、まったく無気力である

A = -1.05  
B = -0.67  
C = 1.72

[3] 不安・焦燥

- A : 不安感やいらいら感はない
- B : 不安感やいらいら感が認められる
- C : いらいら感をコントロールできず、落ち着きない動作・行動がしばしばみられる

A = -2.04  
B = -0.44  
C = 2.47

[4] 脱抑制行動(易怒性、性的逸脱行動)

- A : 感情や異常な行動を抑制できる
- B : 悪態や乱暴な言葉、または軽い性的な言動が見られる(エロチックな発言や体にさわるなど)
- C : 異常で明らかな怒りや逸脱行為が見られる(物を投げる、つねる、たたく、ひっかく、蹴る、噛みつく、つばを吐く、叫ぶ、服をかってに脱ぐなどの行動)

A = -5.53  
B = -0.78  
C = 6.31

[5] 睡眠障害

- A : よく眠れる
- B : よく眠れない(入眠障害、熟眠障害ないしは早朝覚醒)
- C : 夜間の不穏(せん妄をふくむ)がある

A = -1.72  
B = -0.98  
C = 2.70

付加情報：B を選択した場合、以下のうち認められるものにする。複数選択可。

入眠障害( ) 途中覚醒・熟眠障害( ) 早朝覚醒( )

[6] 表情

- A : 表情は豊かで、明るい
- B : 表情が乏しく、暗い
- C : 不適切な感情表現(情動失禁など)がある

A = -0.80  
B = -0.45  
C = 1.25

[7] 病態・治療に対する対応

- A : 自分の身体の状態を認識し、その治療に前向きである
- B : 自分の身体の状態を認識しているが、治療への積極性がない
- C : 自分の身体の状態を認識していない

A = -1.18  
B = -0.29  
C = 1.47

[8] 対人関係

- A : 家族やスタッフとの交流は良好である
- B : 家族やスタッフとのかわりに消極的で、関心が薄い
- C : 周囲との交流はほとんどなく、人との接触到拒否的である

A = -1.30  
B = -0.58  
C = 1.89

Total	
Constant	+14.00
Total score =	