

## 正誤表

### 「アルテプラザー静注療法のチェックリスト」

#### 禁忌 血液所見

正	誤
血糖異常 (<50mg/dL, または >400mg/dL)	血糖異常 (50mg/dL 以下, 400mg/dL 以上)
ワーファリン内服中, PT-INR >1.7	ワーファリン内服中, PT-INR 1.7 以上

### 「アルテプラザー静注療法後の管理指針」

正	誤
1. 神経学的評価 a.投与開始～1時間 (rt-PA 投与中) : 15分毎の評価 b.1～7時間 : 30分毎 c.7～24時間 : 1時間毎	1. 神経学的評価 a.rt-PA 投与中 : 15分毎の評価 b.投与後6時間まで : 30分毎 c.6～24時間まで : 1時間毎
2. 血圧モニタリング a.投与開始～2時間 : 15分毎の測定 b.2～8時間 : 30分毎 c.8～24時間 : 1時間毎	2. 血圧モニタリング a.治療開始後2時間まで : 15分毎の測定 b.6時間まで : 30分毎 c.24時間まで : 1時間毎

## 改訂理由

### 「アルテプラゼ静注療法のチェックリスト」

#### 禁忌 血液所見

改訂箇所	改訂理由
血糖異常 (<50mg/dL, <b>または</b> >400mg/dL)	<p>1996 米国ガイドライン(Circulation.1996;94:P 1171) : NINDS 試験の除外基準として「less than 50mg/dL or greater than 400mg/dL」と記載されている</p> <p>2003 米国ガイドライン(Stroke.2003;34:P 1067 表 7)、2005 米国ガイドライン(Stroke.2005;36:P 919 表 7) : rt-PA の適応患者の基準に「血糖値≥ 50mg/dL (2.7 mmol/L)と記載されている</p> <p>国内添付文書 : 【禁忌】(3)2「投与前の血糖値が 400mg/dL を超える患者、(8)「投与前の血糖値が 50mg/dL 未満の患者」と記載されている</p>
ワーファリン内服中, PT-INR >1.7	<p>2005 米国ガイドライン(Stroke.2005;36:P 919 表 7) : rt-PA の適応患者の基準に「INR ≤ 1.7」と記載されている</p> <p>国内添付文書 : 【禁忌】(5)「投与前のプロトロンビン時間-国際標準値(PT-INR)が 1.7 を超える」と記載されている</p>

### 「アルテプラゼ静注療法後の管理指針」

改訂箇所	改訂理由
<p>2. 神経学的評価</p> <p>a.投与開始～1時間 (rt-PA 投与中) : 15分毎の評価</p> <p>b.1～7時間 : 30分毎</p> <p>c.7～24時間 : 1時間毎</p>	<p>2003 米国ガイドライン(Stroke.2003;34:P 1067 表 8) : 「Perform neurological assessments every 15 minutes during the infusion of rtPA and every 30 minutes for the next 6 hours and then every hour until 24 hours from treatment」と記載されている</p>
<p>2. 血圧モニタリング</p> <p>a.投与開始～2時間 : 15分毎の測定</p> <p>b.2～8時間 : 30分毎</p> <p>c.8～24時間 : 1時間毎</p>	<p>2003 米国ガイドライン(Stroke.2003;34:P 1067 表 8) : 「Measure blood pressure every 15 minutes for the first 2 hours, every 30 minutes for the next 6 hours, and then every hour until 24 hours from treatment」と記載されている</p> <p>国内添付文書 : 【使用上の注意】2.重要な基本的注意(8)「なお、米国における虚血性脳血管障害に対する治療ガイドラインでは、本剤投与開始後 24時間の血圧管理について次のように推奨されて</p>

	<p>いる。 投与開始 2 時間までは 15 分毎、次の 6 時間は 30 分毎、24 時間までは 60 分毎に血圧を確認すること」と記載されている</p>
--	--