

表5 脳卒中運動機能障害重症度スケール(JSS-M)

(日本脳卒中学会Stroke Scale委員会)

施設名:	検者名:
患者名(イニシャル):	年齢: 歳 男・女
患者ID: 発症日: / /	検査日: / /
診断名:	麻痺側(右、左、両) 利き手(右、左、両)

1. Facial Palsy(顔面麻痺)

A. なし	<input type="checkbox"/> A = -1.27
B. あり	<input type="checkbox"/> B = 1.27

2. Dysphagia(嚥下障害)

A. なし	<input type="checkbox"/> A = -4.93
B. 時にむせることがある	<input type="checkbox"/> B = -0.89
C. Tube feedingが必要	<input type="checkbox"/> C = 5.82

3. Arm(腕)

A. 肘を伸ばしたまま腕を挙上できる	<input type="checkbox"/> A = -0.97
B. 肘を屈曲すれば挙上できる	<input type="checkbox"/> B = -0.09
C. 重力に抗して運動できない	<input type="checkbox"/> C = 1.06

4. Hand(手)

A. 正常	<input type="checkbox"/> A = -1.26
B. そばに置いたコップが持てる	<input type="checkbox"/> B = -0.16
C. 物がつかめない	<input type="checkbox"/> C = 1.42

5. Leg(下肢近位筋)

臥位で検査する

A. 正常	<input type="checkbox"/> A = -1.04
B. 膝立て可能	<input type="checkbox"/> B = 0.14
C. 膝立て不能	<input type="checkbox"/> C = 0.89

6. Ankle(足関節)

坐位で検査する(坐位がとれない場合は臥位の筋力から推定する)

A. 爪先を上げられる	<input type="checkbox"/> A = -0.52
B. 爪先を上げられない	<input type="checkbox"/> B = 0.52

7. Complex Movement(複合運動)

ベッド上仰臥位からベッド脇で立位になるまでの一連の動作

A. ベッド脇に立てる	<input type="checkbox"/> A = -1.24
B. ベッド上に坐れる	<input type="checkbox"/> B = -0.39
C. 坐れない	<input type="checkbox"/> C = 1.63

8. Gait(歩行)

A. 補助具なしに歩ける	<input type="checkbox"/> A = -3.63
B. 補助具なしは介助者があれば歩ける	<input type="checkbox"/> B = -0.45
C. 自力では歩けない	<input type="checkbox"/> C = 4.08

TOTAL =	<input type="text"/>
CONSTANT	14.60
SCORE =	<input type="text"/>

(日本脳卒中学会・脳卒中運動障害重症度スケール(JSS-M)の発表にあたって. 脳卒中 1999; 21: 352-356)