

脳卒中運動機能障害重症度スケール調査票 (JSS-M)

(日本脳卒中学会 Stroke Scale 委員会)

施設名: _____ 検者名: _____
 患者名 (イニシャル): _____ 年齢: _____ 歳 男・女
 患者 ID: _____ 発症日: ____ / ____ / ____ 検査日: ____ / ____ / ____
 診断名: _____ 麻痺側 (右, 左, 両) _____ 利き手 (右, 左, 両) _____

- | | |
|---|---|
| <p>[1] Facial Palsy (顔面麻痺)
 A. なし
 B. あり</p> | <p>A = -1.27
B = 1.27</p> |
| <p>[2] Dysphagia (嚥下障害)
 A. なし
 B. 時にむせることがある
 C. Tube feeding が必要</p> | <p>A = -4.93
B = -0.89
C = 5.82</p> |
| <p>[3] Arm (腕)
 A. 肘を伸ばしたまま腕を挙上できる
 B. 肘を屈曲すれば挙上できる
 C. 重力に抗して運動できない</p> | <p>A = -0.97
B = -0.09
C = 1.06</p> |
| <p>[4] Hand (手)
 A. 正常
 B. そばに置いたコップが持てる
 C. 物がつかめない</p> | <p>A = -1.26
B = -0.16
C = 1.42</p> |
| <p>[5] Leg (下肢近位筋)
 臥位で検査する
 A. 正常
 B. 膝立て可能
 C. 膝立て不能</p> | <p>A = -1.04
B = 0.14
C = 0.89</p> |
| <p>[6] Ankle (足関節)
 坐位で検査する (坐位がとれない場合は臥位の筋力から推定する)
 A. 爪先を上げられる
 B. 爪先を上げられない</p> | <p>A = -0.52
B = 0.52</p> |
| <p>[7] Complex Movement (複合運動)
 ベッド上仰臥位からベッド脇で立位になるまでの一連の動作
 A. ベッド脇に立てる
 B. ベッド上に坐れる
 C. 坐れない</p> | <p>A = -1.24
B = -0.39
C = 1.63</p> |
| <p>[8] Gait (歩行)
 A. 補助具なしに歩ける
 B. 補助具ないしは介助者があれば歩ける
 C. 自力では歩けない</p> | <p>A = -3.63
B = -0.45
C = 4.08</p> |

TOTAL =
 CONSTANT 14.60

SCORE =